



香港愛滋病醫學會
HONG KONG SOCIETY FOR HIV MEDICINE

愛滋病病毒感染者接種 2019 冠狀病毒疫苗（新冠疫苗）事宜

愛滋病病毒感染者如患上 2019 冠狀病毒病（COVID-19），有較高機會引致嚴重併發症。雖然還未有關於愛滋病病毒感染者參與新冠疫苗臨床測試的詳細數據，但由於現時可供使用的新冠疫苗皆為「非活疫苗」（non-live vaccine），加上現有關於疫苗的安全數據，因此病人對接種疫苗毋需有太大顧慮。由於接種疫苗預計的益處大於風險，除非有醫學上的禁忌症，學會建議愛滋病病毒感染者接種新冠疫苗以預防感染。接種疫苗前，病人亦可向主診醫生查詢。

1. 愛滋病病毒感染者應否接種新冠疫苗？

由於接種疫苗預計的益處大於風險，除非有醫學上的禁忌症，學會建議愛滋病病毒感染者不論 CD4 白血球的數值多少，均可接種新冠疫苗預防感染。由於疫苗在愛滋病病毒感染者身上產生的效能因人而異，因此接種疫苗後，仍需繼續維持各項感染控制措施，例如佩戴外科口罩、勤洗手、以及保持社交距離等。

2. 新冠疫苗對於愛滋病病毒感染者是否安全？

現時由本地疫苗接種計劃提供的疫苗，其成份由於並非使用存活的新型冠狀病毒，故此接種疫苗不會使人感染 COVID-19。此外，現時未有數據顯示愛滋病病毒感染者於接種疫苗後會產生更多副作用。

病人如有其他慢性疾病、藥物敏感等疑問，可先向主診醫生查詢是否適合或需要延遲接種疫苗。

3. 新冠疫苗會否影響抗愛滋病藥物治療？

疫苗跟抗愛滋病病毒藥物並沒有藥物交互作用（drug-drug interaction）。因此，愛滋病病毒感染者應在接種疫苗前後繼續服用藥物。